

Вышеуказанные преступники, вызывающие инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), МОГУТ НАГАДЫВАТЬ на жертву:

- при вагинальном, оральном и анальном сексе с зараженным человеком (все ИППП);
- при тесном телесном контакте с человеком, который имеет язвочки и другие высыпания, характерные для ИППП (сифилис, генитальный герпес);
- при использовании общих с больным человеком или шприцев при введении наркотиков внутривенно (гепатит В, ВИЧ/СПИД);
- при использовании нестерильного медицинского инструмента (гепатит В, ВИЧ/СПИД);
- при контакте с кровью больного (гепатит В, ВИЧ/СПИД, сифилис, генитальный герпес);
- очень-очень редко в быту при пользовании предметами обихода и гигиении больных людей (сифилис, гонорея, генитальный герпес, гепатит В, трихомоназ).

Дети могут подвернуться нападению преступника во внутриутробный период, во время родов и в процессе ухода за ними, если большая их мать.

Преступники, вызывающие инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ на вашем пути, если вы:

1. Имеете одного постоянного партнера, который живет только с вами.

2. Избегаете случайных половых связей.

3. Поговорите со своим партнером о его прошлых сексуальных контактах и об использовании им наркотиков внутривенно. И не будете вступать в половую связь с тем, кто вызывает подозрение.
4. Обязательно пользуетесь презервативом при любом сексуальном контакте.

Следы преступной деятельности, при которых НЕМЕДЛЕННО надо обратиться в здравоохранительные органы:


- Зуд и жжение в области половых органов.
- Очень частое, болезненное мочеиспускание.
- Необычные выделения и запах из половых органов.
- Покраснение в области половых органов и заднего прохода.
- Появление сыпи на теле.
- Язвочки, пузырьки, «прышечки» на половых органах, вокруг анального отверстия, во рту, на губах.
- Увеличение лимфатическихузлов, особенно в паховой области.
- Боль внизу живота, боль во влагалище во время полового акта, кровянистые выделения из влагалища между менструациями у женщин.

Но ПОМНИТЕ, что преступники коварны и очень часто не оставляют на месте преступления никаких следов (и болезнь никак себя не проявляет). Поэтому, если у вас есть повод считать, что вы могли заразиться, обратитесь к специалисту по ИППП – дерматовенерологу в КВД или гинекологу в «Ариадну». (Ирина Олейник)

Чем раньше начата борьба с преступником, тем выше шанс избавиться от него, не получить осложнений и не подвергнуть опасности любимого человека.

Ариадна Клиника, дружественная к молодежи unicef

Немного о том, что должен знать каждый



Инфекции, передаваемые половым путем



г. Братск, ул. Жукова, 8,
тел. (3953) 45-98-08

По материалам РОО «Взгляд в будущее»

РАЗЫСКИВАЮТСЯ! wanted!

Бледная трепонема

Из «группировки» спирохет! Обвиняется в том, что внедряется в различные части тела (половые органы, рот, задний проход) и вызывает сифилис, протекающий в несколько стадий. Первая стадия характеризуется появлением через 3-4 недели на том месте, куда внедрился трепонема, небольшой безболезненной язвочки (твердого шанкера) и воспалением сначала ближайших к ней лимфоузлов, а затем всех осталых, которые также безболезненны. Через 6-7 недель шанкр заживает, что успокаивает жертву коварного мошонничества трепонемы. Но начинается вторичная стадия сифилиса, при которой на теле, на слизистой полости рта и половых органах периодически появляется, то исчезает сыпь, а также наблюдаются лихорадка, усталость, боль в суставах, реже — выпадение волос. Если скрывать мошонницу, то через 3-5 лет (или более) после внедрения трепонемы наступает третья стадия сифилиса, которая приводит к поражениям спинного и головного мозга, костей, психическим заболеваниям, параличу.

Гонококк

Вину вменяется: вызывает гонорею (триппер). У встретившихся с этим особо распространенным преступником через 2-21 день могут появиться желтовато-зеленоватые гноевые выделения из половых органов, отек, боль, жжение при мошоннических симптомах. Также могут появиться боли в животе и кровянистые выделения из влагалища у женщин и боль в мошонке у мужчин. Гонококк может поражать также прямую кишку, слизистую рта, глотки и глаз. После 2 недель симптомы могут исчезнуть даже без лечения, и болезнь переходит в хроническую стадию с периодическими обострениями. При несвоевременном обращении в органы здравоохранения у вас могут возникнуть осложнения: воспаление придатков яичек, простаты у мужчин; воспаление матки, яичников, маточных труб и даже воспаление брюшины у женщин. Это может привести к бесплодию, а у мужчин — и к импотенции!

Вирус гепатита В (НВВ)

Криминальный авторитет, серезано поражающий печень. Пораженная им печень теряет способность обезвреживать ядовитые вещества, нарушаются витаминный баланс. Он крайне опасен, так как очень жизнеспособен и стоек. И если вы заметили, что у вас пожелтели белки глаз, язык, моча стала темного цвета (цвета чая крепкой заварки), или стал обесцвеченным (цвета белой или серой глины), а также вы наблюдаете пожелтение кожи (желтуху), чувствуете усталость, кожный зуд, снижение аппетита, боли в животе, изжогу, тошноту, — это значит, что преступник проник на вашу территорию! Следует немедленно заявить о факте преступления, чтобы избежать

опасных последствий, которые несет органам человека оставленный без внимания преступник (цирроз печени, увеличение риска рака печени). Но преступник может себя и никак не проявлять, и гепатит в совершенно незаметно для жертвы может перейти в хроническую стадию. В настоящее время существует возможность защищаться от страшного преступника с помощью вакцины.

Вирус папилломы человека

Следы, оставленные этим разбойником на месте преступления и проявляющиеся в среднем через 3 месяца, похожи на бородавки. На слизистой половых органов, вокруг них, в области заднего прохода появляются бородавчатые разрастания телесного или светло-розового цвета. Они либо увеличиваются со временем в размере и количестве и приобретают вид цветной капусты (петушиного гребня), либо остаются плоскими и малозаметными. Бородавки (кондиломы) вызывают зуд, жжение, небольшие кровотечения, боли при мошонническании, ходьбе, половиках. После исчезновения кондилом, вирус остается в организме, поэтому они могут появиться снова. По информации спецслужб, стало известно, что множество случаев рака шейки матки и яичников у женщин и часть раковых заболеваний половых органов у мужчин напрямую связаны с деятельностью преступника.

Вирус простого герпеса, вызывающий генитальный герпес

Особо опасный преступник-рецидивист. Если он однажды нападет на вас, вы уже не избавитесь от него никогда, уничтожить его невозможно, и борьба с ним направлена на смягчение течения болезни, уменьшение количества и тяжести рецидивов (повторных проявлений болезни). Через 1-30 дней после нападения преступника у вас в области половых органов или заднего прохода могут возникнуть зуд, жжение, покраснение, а вслед за ними пузырьки, которые быстро лопаются. На их месте появляются болезненные язвочки. В это время могут беспокоить сильные головные боли, может ухудшиться самочувствие, увеличиться лимфоузлы. У мужчин может ощущаться боль при мошоннических симптомах, у женщин — боль в области половых органов при ходьбе, во время половиках актов. Язвочки и неприятные ощущения могут исчезнуть в течение нескольких недель, но вирус остается в организме, и в результате переохлаждений, перегорялений либо налиния других инфекций болезнь может проявляться снова. Совершенно секретно: у беременных женщин генитальный герпес может привести к выкидышам, преждевременным родам, иногда — к аномальному развитию ребёнка, также достоверно выявленна связь преступника и рака половых органов!

Трихомонада

Особо коварна. Ведет одноклеточный паразитический образ жизни. Состав преступления: вызывает трихомоназ! Столкнувшись с преступницей через 4-21 день может вызвать обильное пеинистическое выделение с неприятным запахом, сильный зуд, раздражение в области половых органов, частое болезненное мочеиспускание. Но помните: преступница умеет хорошо маскироваться и может себя никак не проявить, поражая при этом мочевые пути, внутренние половые органы и приводя к бесплодию.

Хламидия

Выывает хламидиоз! Преступница очень опасна, так как действует как прыщак, проникая и не оставляя на месте преступления никаких следов. Только у немногих могут проявиться признаки ее преступной деятельности: слизистые выделения, напоминающие клей, боль в уретре или влагалище, жжение или болезненность во время мочеиспускания. Хламидия может поражать не только мочеполовые органы, но и глаза, кишечник, органы дыхания, суставы. Как и трихомонада, хламидия может привести к бесплодию.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Самый страшный и очень опасный представитель преступного мира. Его нападение на человека приводит к смерти, так как эффективных средств борьбы с ним пока не существует. Состав преступления: вызывает ВИЧ-инфекцию, конечной стадией которой является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). ВИЧ поражает клетки, которые должны бороться с инфекциями, — клетки иммунной системы. В ответ на нападение преступника многие жертвы могут реагировать повышенением температуры, усталостью, рвотой, диареей, увеличением лимфоузлов. Но затем симптомы исчезают. У некоторых же нет вообще никаких симптомов, чтобы определить, было ли ВИЧ совершено преступление, необходимо 3-6 месяцев. Так как это время нужно для выработки антител к нему. Только подсчитывая антилера, можно говорить о наличии факта преступления. Но пока ВИЧ-инфекция не перешла в стадию СПИДа, человек может чувствовать себя здоровым и ни о чем не подозревать (этот период может длиться до 12 и даже более лет). На стадии СПИДа иммунная система человека уже так ослаблена, что начинают развиваться заболевания, необычные для здоровых людей: тяжелые трибковые заболевания, опухоли, пневмонии, поражения кожи.

Не предпринимать действий к самолечению!! В случае подозрения или признаков преступной деятельности обращаться в органы здравоохранения!! О факте преступления сообщить партнеру!! До окончаниялечения воздерживаться от секса!!!

Фото: Ю. А. Красильников, А. А. Смирнов